

VACINAS DISPONÍVEIS PARA USO NO MUNICÍPIO E SUAS CARACTERÍSTICAS

Características das vacinas em uso no município de acordo com informações descritas nas bulas disponíveis no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

CoronaVac (Instituto Butantan)		
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS	POSSÍVEIS RISCOS	INDICAÇÃO
Os estudos sobre a eficácia da vacina demonstraram resultados superiores a 92% nos participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 14 dias e mais do que 97% em participantes que tomaram as duas doses da vacina no intervalo de 28 dias.	<p>Reação muito comum: dor no local da aplicação.</p> <p>Reação comum: cansaço, febre, dor no corpo, diarreia, náusea, dor de cabeça.</p> <p>Reação incomum: vômitos, dor abdominal, distensão abdominal, tonturas, tosse, perda de apetite, reação alérgica, pressão arterial elevada, hipersensibilidade alérgica ou imediata. Apresentar no local da aplicação coloração anormal, inchaço, coceira, vermelhidão, diminuição da sensibilidade e endurecimento.</p>	Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.
<p>Acesse a bula, clique aqui.</p>		

Oxford/Astrazeneca (Fiocruz)		
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS	POSSÍVEIS RISCOS	INDICAÇÃO
<p>Os estudos sobre a eficácia da vacina Covid-19 (recombinante) demonstraram resultados maior ou igual a 98% dos indivíduos em 28 dias após a primeira dose e maior de 99% em 28 dias após a segunda dose.</p>	<p>Reação muito comum: sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira ou hematomas no local da aplicação e sensação de indisposição de forma geral, fadiga, calafrio ou sensação febril, dor de cabeça, náusea, dor nas articulações e dor muscular.</p> <p>Reação comum: inchaço, vermelhidão ou um caroço no local da aplicação e febre, enjoos, diarreia, sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre acima de 38 °C, dor de garganta, coriza, tosse e calafrios.</p> <p>Reação incomum: sonolência ou sensação de tontura, diminuição do apetite, dor abdominal, linfonodos (ínguas) aumentados, sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele.</p> <p>Reação muito rara: coágulos sanguíneos importantes em combinação com níveis baixos de plaquetas no sangue (trombocitopenia) foram observados com uma frequência inferior a 1 em 100.000 indivíduos vacinados.</p> <p>Reação desconhecida: alergia grave (anafilaxia), inchaços graves nos lábios, face, boca e garganta.</p>	<p>Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.</p>
<p>Acesse a bula, clique aqui.</p>		

Pfizer/Wyeth		
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS	POSSÍVEIS RISCOS	INDICAÇÃO
<p>A eficácia vacinal geral foi de 95% (90,0%–97,9%), tendo sido semelhante nas diferentes faixas etárias. Analisando dados desses estudos, a eficácia após duas semanas da primeira dose e antes da segunda dose foi de 92,6% (69,0%-98,3%).</p>	<p>Reação muito comum: dor e inchaço no local de aplicação, cansaço, dor de cabeça, diarreia, dor muscular, dor nas articulações, calafrios e febre.</p> <p>Reação comum: vermelhidão no local de aplicação, náusea e vômito.</p> <p>Reação incomum: aumento dos gânglios linfáticos (ou ínguas), reações de hipersensibilidade, por exemplo, erupção cutânea, coceira, urticária, inchaço das partes mais profundas da pele ou da mucosa, diminuição de apetite, dor nos membros, insônia, cansaço e lentidão de reações e reflexos, suor excessivo, suor noturno, fraqueza, cansaço físico intenso, sensação de mal estar e prurido no local de injeção.</p> <p>Reação rara: paralisia facial aguda.</p> <p>Reação desconhecida: alergia grave (anafilaxia)</p>	<p>Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.</p>
<p>Acesse a bula, clique aqui.</p>		

Janssen (Johnson&Johnson)		
SEGURANÇA, EFICÁCIA E BENEFÍCIOS	POSSÍVEIS RISCOS	INDICAÇÃO
<p>A eficácia vacinal de todos os indivíduos após 14 dias da vacinação foi de 66,9% (59,03% - 73,40%)</p>	<p>Reação muito comum: dor de cabeça, náusea, dores musculares, dor no local da injeção e sensação de muito cansaço.</p> <p>Reação comum: vermelhidão no local da injeção, inchaço no local da injeção, arrepios, dor nas articulações, tosse e febre.</p> <p>Reação incomum: irritação na pele, fraqueza muscular, dor no braço ou perna, sensação de fraqueza, sensação de indisposição geral, espirros, dor de garganta, dor nas costas, tremor e suor excessivo.</p> <p>Reação rara: reação alérgica e urticária.</p> <p>Reação desconhecida: alergia grave.</p>	<p>Pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.</p>
<p>Acesse a bula, clique aqui.</p>		